

# Lonicera hypoglauca

synonyma: *Caprifolium hypoglaucum*, *Caprifolium mollissimum*, *Lonicera affinis* var. *hypoglauca*, *Lonicera affinis* var. *mollissima*, *Lonicera affinis* var. *pubescens*, *L.* subsp. *nudiflora*, *Lonicera rubropunctata*

čeleď: *Caprifoliaceae*

oblasti: Čína, Japonsko

Roste v Číně a Japonsku v podobě popínavého opadavého keře. Větve jsou v mládí spolu se spodní stranou listů, centrálním horním žebrem a stopkami květů hustě žlutošedě ochlupené. Listy jsou vejčité až vejčité podlouhlé, dlouhé 3 - 10cm, široké 1,5 - 5cm, papírovité, na spodní straně někdy moučnatě zelené, žlásky přisedlé až krátce žlutooranžově stopkaté, báze téměř zaoblená nebo téměř srdčitá, konec špičatý a řapíky dlouhé 0,5 - 1,2cm. Kvete v párech nebo ve svazečcích či hroznech na krátkých postranních větvích, stopky jsou kratší nebo i delší řapíků, listeny jsou čárkovitě kopinaté, listence okrouhle vejčité nebo vejčité (i vejčité kopinaté), zašpičatělé, kališní trubka holá nebo někdy i ochlupená, kališní lístky 3úhle kopinaté, brvité, koruna bílá, někdy načervenalá, později žlutá, velká 3,5 - 4cm, 2pyská, trubka delší než pysky, vnější strana přitiskle ochlupená nebo holá, někdy žláznatá. Plody jsou ve zralosti černé, téměř kulaté, někdy ojněné, velké 7 - 8mm a obsahují černohnědá eliptická semena délky 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *hypoglauca*/*Caprifolium hypoglaucum*/*L. affinis* var. *hypoglauca*/*L. affinis* var. *pubescens*/*L. rubropunctata* - Čína, Japonsko; koruna na vnější straně přitiskle ochlupená, často žláznatá
- subsp. *nudiflora* - Čína; koruna na vnější straně holá, trubka přitiskle ochlupená bez žláz

<https://www.rostliny.net/>