

# Lonicera inodora

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě popínavého keře. Větve v mládí s řapíky, stopkami květů, někdy i s listeny a listenci a kališními trubkami hustě šedožlutohnědě hřebíkatě a řídce žláznatě ochlupené. Listy jsou vejčitékopinaté až vejčitéeliptické nebo vejčité, dlouhé 3 - 8cm, široké 1,3 - 4,3cm, tlustě papírovité, na spodní straně plstnaté, na žilkách velmi hustě ochlupené (za plodu řídce), žilky jsou na spodní straně nápadně vystouplé, centrální žebro hustě ochlupené, báze zaoblená až uťatá nebo mělce srdčitá, konec náhle zúžený a zašpičatělý nebo hrotitý a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Květy jsou seskupené i ve více než 10ti párech v paždí nebo terminálních chocholících s listovitými listeny, stopky květů dlouhé 0,3 - 1,5cm, listeny vejčité kopinaté, dlouhé 1 - 2mm, kratší než kališní trubka, listence okrouhle vejčité, vejčité nebo úzce vejčité, krátce žlutobíle ochlupené, konec tupý nebo zaoblený, kališní trubka okrouhlá nebo eliptická, dlouhá 2 - 4mm, vnější strana holá až krátce ochlupená, přisedle žláznatá, laloky vejčité 3úhlé, velké 1mm, koruna bílá, později žlutá, velká 1,5 - 2,5cm, vnější strana ochlupená, 2pyská, trubka stejně dlouhá nebo mírně přesahující pysky, laloky horního pysku 3mm. Plody jsou modročerné, téměř okrouhlé, mírně ojíňené a tlusté 6mm.

<https://www.rostliny.net/>