

Lonicera involucrata (Zimolez zákrovečný)

synonyma: *Caprifolium involucratum*, *Caprifolium ledebourii*, *Distegia involucrata*, *Lonicera flavescens*, *Xylosteon involucratum*, *Xylosteon ledebourii*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Manitoba, Mexiko, Michigan, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Nunavut, Ontario, Oregon, Quebec, Saskatchewan, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste od Aljašky po Mexiko v podobě opadavého vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 1 (i 3)m. Větve jsou holé, mírně 4hranné. Listy jsou bledě zelené, tenké, elipticky vejčité až dlouze kopinaté nebo obvejčitě kopinaté, dlouhé 5 - 14cm, na spodní straně ochlupené a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Květy jsou párovité, pravidelné, žluté až oranžovožluté, načervenalé, krátce trubkovité, dlouhé 1 - 1,5cm, lem vzpřímený, stopky dlouhé 2 - 3cm a listeny jsou červené. Plody má mírně jedovaté, černočervené, kulaté, lesklé a velké 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *flavescens* - severozápad USA; listy dlouze kopinaté, bledě zelené, holé, dlouhé 5 - 12cm
- f. *humilis* - Kolorado; keř; výška 60cm; větve jemně ochlupené; listy oválné nebo podlouhle vejčité, zašpičatělé, dlouhé 4 - 6cm, brvité; koruna dlouhá 1,2 - 1,5cm, žlutá nebo načervenalá, na vnější straně ochlupená
- f. *serotina* - Kolorado; keř; výška 1m nebo i více; listy velké, elipticky podlouhlé a holé; květy oranžovožluté, později až červené, dlouhé 1,5 - 2cm
- 'Ledebourii'

<https://www.rostliny.net/>