

# Lonicera japonica (Zimolez japonský)

synonyma: *Caprifolium chinense*, *Caprifolium japonicum*, *Caprifolium roseum*, *Lonicera brachypoda*, *Lonicera brachypoda* var. *repens*, *Lonicera fauriei*, L. f. *macrantha*, L. var. *repens*, L. var. *sempervillosa*, *Lonicera shintenensis*

čeleď: *Caprifoliaceae*

oblasti: Alabama, Andalusie, Arizona, Arkansas, Connecticut, Čína, Delaware, Florida, Francie, Georgia, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Itálie, Japonsko, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Korea, Korsika, Louisiana, Maine, Makaronésie, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Severní Karolína, Střední střeozemí, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Velká Británie, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Číně, Japonsku a Koreji v podobě poloopadavého až stálezeleného ovíjivého keře. Dorůstá délky 3 - 6 (i 10)m. Větve jsou v mládí tmavě červeně hnědé nebo růžově fialově černé, hustě žlutohnědě odstále ochlupené, žláznaté, obvykle ve spodní části holé. Listy jsou vejčité, až dlouze vejčité nebo dokonce vejčité kopinaté (i okrouhle vejčité nebo obvejčité, vykrajované), dlouhé 3 - 9,5cm, široké 1,5 - 4cm, spodní strana zelená, horní také, jsou papírovité, na obou stranách v horních částech hustě ochlupené, báze zaoblená až téměř srdčitá, okraj brvitý, konec špičatý nebo zašpičatělý, vzácně tupý, zaoblený nebo otupělý a řapíky jsou hustě ochlupené, dlouhé 4 - 8mm. Stopky květů jsou dlouhé 1 - 4cm, listeny jsou vejčité až eliptické, dlouhé 2 - 3cm, z obou stran ochlupené (i téměř holé), laloky vejčité 3úhlé nebo úzce 3úhlé, špičaté, květy nápadně vonné, koruna bílá nebo bílorůžová až bíložlutá, někdy na bázi červená, na slunci nakonec žlutá nebo na vnější straně růžovofialová, uvnitř bílá, velká (2 -) 3 - 4 (i 6)cm, 2pyská, trubka bývá delší než laloky, laloky horního pysku tupé. Plody jsou ve zralosti černé nebo modře černé, kulovité, velké 6 - 7mm, obsahují hnědá vejčítá nebo eliptická semena velikosti 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Acumen' - žlutooranžové květy
- 'Aureoreticulata' - žlutá barva květů
- 'Dart's Acumen' - půdokryvný stálezelený nebo polostálezelený; květy bílé, později žluté; rychlý růst
- 'Hall's Prolific' - stálezelený, popínavý; listy vejčité; bílé až světle krémová barva květů, vonné, bohaté; rychlý růst
- 'Halliana' - listy v mládí oboustranně ochlupené; koruna bílá (i načervenalá), při odkvětu nažloutlá, horní pysk rozeklaný max. do 1/2; plody černé
- 'Horwood Gem' - menší než 'Halliana'; listy v mládí zeleno béžově pestré, později zelené; květy béžové, vonné
- var. *chinensis*/L. *chinensis*/L. *japonica* var. *japonica* f. *chinensis*
- 'Interold'/'Dart's World' - rozkladitý křovinatý; výška do 25cm, šířka do 1,2m; kmínky tmavěhnědé; květy na vnější straně růžově fialově červené, uvnitř bílé; listy tmavězelené, dlouhé do 7cm, široké 3cm,
- var. *japonica*/*Caprifolium japonicum*/L. *fauriei*/var. *sempervillosa*/L. *shintenensis*/*Nintooa japonica* - Čína, Japonsko, Korea; větve v mládí tmavě červenohnědé; koruna bílá, později žlutobílá
- 'Maskerade' - opadavé popínavé keře; výška 4m; listy tmavězelené s úzkým béžovobílým okrajem (ve stáří užší); květy na vnější straně světlerůžové, uvnitř téměř bílé, poupata růžovočervená
- 'Mint Crisp' - poloopadavý ovíjivý keř; výška do 3,5m; listy bledě zelené, výrazně béžově bílé až bílé kropenaté, na podzim narůžovělé; květy bílé, později žloutnou; rychlý růst
- 'Purpurea' - listy a větve bronzově růžově fialové; květy na vnější straně růžově fialově červené, uvnitř bílé
- var. *repens* - Čína; ovíjivý nebo poléhavý keř; výška 1,5m; větve červené; listy dlouze vejčité,

obvykle dubovitě laločnaté, dlouhé 6 - 12cm, horní strana zelená, spodní šedozelená, žilky bývají načervenalé; květy bílé, později žloutnou, horní pysk dělený na krátké vejčité cípy

- 'Reticulata'/'Aureo-reticulata' - ovíjivý nebo plazivý keř; výška do 2m; listy mají žlutou žilnatinu, někdy jsou laločnaté, malé, okrouhlé až podlouhlé, celokrajné; květy bílé
- 'Thunberg'
- 'Thunberg Chinensis'
- 'Variegata' - listy žlutopestré

<https://www.rostliny.net/>