

Lonicera pampaninii

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Čína

Roste v Číně v podobě popínavé rostliny. Mladé větve a řapíky jsou hustě žlutě ochlupené, později růžovofialovohnědé a holé. Listy občas vyrůstají v 3četných přeslenech, jsou dlouze kopinaté nebo úzce eliptické až vejčité kopinaté, dlouhé 3 - 10cm, široké 1,3 - 2,8cm, tenké kožovité, na centrálním žebří z obou stran krátce ochlupené, na spodní bývají v mládí krátce řídce ochlupené, báze mělce srdčitá, okraj mírně podvinutý, řídce brvitý, konec zašpičatělý a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm.

Květenství tvoří několik párů květů umístěných na koncích větví anebo samostatných květů v paždí listů v horní části mladých větví, jsou vonné, stopky květů krátké až téměř chybí, listeny, listence a kališní lístky krátce ochlupené, listeny úzce kopinaté až vejčité kopinaté, velké 0,5 - 1,5cm, listence okrouhle vejčité nebo vejčité, kališní trubka je dlouhá do 2mm, kališní lístky vejčité 3úhlé až úzce 3úhlé, kratší trubky, okraj brvitý, koruna bílá, bývá narůžovofialověločervená, později žlutá, 2pyská, velká 1,5 - 2cm, na vnější straně hustě hřebíkatá, žláznatě ochlupená a pysky jsou mírně kratší než trubka. Plodem je modročerná nebo černá kulovitá bobule velikosti 5 - 6mm.

<https://www.rostliny.net/>