

Lonicera subhispida

synonyma: *Lonicera monantha*, *Lonicera praeflorens*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Čína, S Korea

Roste na Dálném východě, Číně a severní Koreji v podobě keře. Dorůstá výšky až 2m. Větve jsou v mládí zelenohnědé nebo červenohnědé, dlouze štětinaté, hustě jednoduše stopkatě žláznaté, s řapíky bývají odstále ochlupené až téměř holé, větve později žlutohnědé a nakonec nahnědlé a šedé, pupeny kulovité nebo okrouhle vejčité, vnější šupiny kožovité, hnědé, lesklé, vnitřní šupiny z obou stran ochlupené a žláznaté. Listy jsou vejčité eliptické nebo dlouze eliptické nebo podlouhlé, dlouhé 4 - 7cm, široké 2,2 - 5,5cm, báze je klínovitá, v mládí oboustranně hustě přitiskle štětinatě ochlupené a řapíky jsou také štětinaté a žláznaté, dlouhé 3 - 7mm. Květy mají 1 široce kopinatý dlouze zašpičatělý ochlupený žláznatý listen délky 0,7 - 1,4cm, kališní okraj rozeklaný na krátké zuby, koruna (trubkovitě) nálevkovitá, žlutá, na vnější straně řídce stopkatě žláznatá a ochlupená, dlouhá 1,5 - 2cm, okraj 2x kratší než trubka, semeníky jsou dlouhé 3 - 3,5mm a stopky květů jsou dlouhé 1 - 2,5cm. Plodem je vřetenovitá až eliptická podlouhlá bobule délky 0,8 - 1,4cm obsahující nažloutlá obvejčitě eliptická semena délky 3,5 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>