

## Lonicera tangutica (Zimolez tangutský)

synonyma: *Caprifolium tanguticum*, *Lonicera aemulans*, *Lonicera cylindriflora*, *Lonicera farreri*, *Lonicera flavipes*, *Lonicera guebriantiana*, *Lonicera hopeiensis*, *Lonicera inconspicua*, *Lonicera kungeana*, *Lonicera longa*, *Lonicera oresbia*, *Lonicera saccata*, *Lonicera saccata* f. *calva*, *Lonicera saccata* var. *tangiana*, *Lonicera schneideriana*, *Lonicera serreana*, *Lonicera shensiensis*, *Lonicera stenosiphon*, *Lonicera szechuanica*, *Lonicera taipeiensis*, *Lonicera tangiana*, L. var. *glabra*, *Lonicera trichogyne*, *Lonicera trichogyne* var. *aequipila*, *Lonicera trichopoda*, *Lonicera trichopoda* var. *shensiensis*, *Lonicera wulingensis*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Čína

Roste v Číně v podobě opadavého rozkladitého keře. Dorůstá výšky do 2 (i 4)m. Větve jsou holé nebo drobně ochlupené, někdy krátce žláznaté, starší větve jsou nahnědlé, zimní pupeny špičaté v šupinách o 2 - 4 párech, vejčité a špičaté. Listy jsou obkopinaté až podlouhlé, obvejčité až eliptické, dlouhé 1 - 4 (i 8)cm, široké 0,5 - 2cm, papírovité, z obou stran ochlupené, někdy holé, pouze na žilkách ochlupené, báze protažená, konec je tupý anebo špičatý a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Kvete symetrickými květy se stopkami o délce 1 - 4,5cm, jsou štíhlé, mohou být ochlupené, listeny úzké, někdy listovité, listence mohou být spojené, sousedící 2 kališní trubky srostlé min. z 1/2, jsou eliptické nebo podlouhlé, holé či ochlupené, koruna bílá nebo nažloutlá i načervenalá, trubkovitě nálevkovitá, velká 0,8 - 1,4cm, na vnější straně holá, občas řídce ochlupená, laloky okrouhle vejčité, velké 2 - 3mm. Plodem je červená 5 - 6mm z 1/2 srostlá bobule s nahnědlými vejčitými až podlouhlými semeny o délce 2 - 2,5mm.

<https://www.rostliny.net/>