

Lonicera tatarinowii

synonyma: *Caprifolium tatarinowii*, *Lonicera hypoleuca*, *Lonicera leptantha*, L. var. *leptantha*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Čína

Roste v Číně v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky až 2m. Mladé větve, řapíky a stopky květů holé, vnější pupeny zimních pupenů jsou v 7 - 8mi párech, jsou vytrvávající a špičaté. Listy jsou dlouze kopinaté nebo podlouhlé, dlouhé 3 - 7cm, široké 1,8 - 3cm, na spodní straně šedobíle drobně plstnaté (kromě centrálního žebra), později pouze řídké nebo olysávající, horní strana holá, báze široce klínovitá až zaoblená, konec špičatý a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květy mají 1 - 2,5cm, štíhlé stopky, listeny jsou 3úhle kopinaté, 1/2 délky kališní trubky, holé, listence pohárkovité, 1/5 až 1/3 délky kališní trubky, sousedící 2 kališní trubky spojení min. z 1/2 (i zcela oddělené), velké 2mm, holé, laloky 3úhle kopinaté, kratší trubky, koruna černorůžovofialová, 2pyská, velká 1cm, na vnější straně holá, trubka 1/2 délky pysků, uvnitř drobně ochlupená, 2 postranní laloky horního pysku hluboce rozeklané, centrální lalok kratší, spodní pysk jazýčkovitý, semeníky 2 - 3pouzdré. Plody jsou červené, téměř kulaté, velké 5 - 6mm a obsahují hnědá podlouhlá nebo téměř kulatá semena.

<https://www.rostliny.net/>