

Lonicera villosa (Zimolez chundelatý)

synonyma: *Lonicera coerulea* var. *villosa*, *Lonicera velutina*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Alberta, Connecticut, Labrador, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Vermont, Wisconsin

Roste v Severní Americe v podobě opadavého keře. Je příbuzná s *L. coerulea*. Větve a zimní pupeny odstávají v ostrém úhlu a jsou hustě plstnaté. Listy jsou z obou stran ochlupené. Květy jsou trubkovitě zvonkovité, na vnější straně ochlupené, trubka je dlouhá max. jako lem. Plodem je modrá bobule. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *solonis* - New Foundland až Minnesota; výšky do 75cm; borka se odlupuje v tenkých pruzích; větve jsou hnědé, měkce ochlupené, ne plstnaté; listy jsou dlouhé 2 - 4cm, na horní straně ochlupené až holé, na spodní ochlupené; květy párovité, vyrůstají v úžlabí horních listů, koruna světležlutá, úzce zvonkovitá, vnější strana holá nebo řídce ochlupená, uvnitř ochlupené; plodem je vejčitá modročerná bobule

<https://www.rostliny.net/>