

Sorbus rehderiana (Jeřáb Rehderův)

synonyma: *Pyrus rehderiana*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Myanmar (Barma), Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v podobě stromu se symetrickou 1/2kulatou korunou anebo jako asymetrický vzpřímený na vrcholu rozložitý keř. Dorůstá výšky do 5 - 8m. Větve jsou v mládí drobně ochlupené. Listy jsou zpeřené, mají 1 - 3cm dlouhé řapíky, tvoří je 15 - 21 lístků po 1 - 1,5cm, lístky jsou podlouhlé, drobně až hrubě pilovité, obě strany ochlupené, dlouhé 2,5 - 5cm, široké 1 - 1,5cm a báze je zkoseně zakulacená nebo klínovitá. Květenství je dlouhé 4 - 6cm, široké 3 - 5cm, květy mají 1 - 2mm stopku, průměr 6 - 8mm, kališní lístky 3úhlé, korunní lístky bílé, vejčité, dlouhé 3 - 5mm a široké 2 - 3,5mm. Plodem je červená, později bílá vejčitá malvice průměru 6 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *cupreonitens* - pupeny, listy podél centrálního žebra a květenství hnědorezavě ochlupené; listy drobně pilovité; plody načervenalé až tmavěčervené
- var. *grosseserrata* - lístky hluboce ostře pilovité; pupeny, spodní strana centrálního žebra a květenství řídce hnědorezavě ochlupené, olysávající; plody bílé
- var. *rehderiana*/S. *hypoglauca*/*Pyrus hypoglauca*/*Pyrus rehderiana* - lístky drobně ostře pilovité; pupeny, spodní strana centrálního žebra a květenství řídce hnědorezavě ochlupené, olysávající

<https://www.rostliny.net/>