

Crataegus curvisepala (Hloh křivokalichý)

synonyma: *Crataegus calycina* subsp. *curvisepala*, *Crataegus kyrstostyla*, *Crataegus monogyna* subsp. *curvisepala*, *Crataegus oxyacantha*, *Crataegus pseudokyrstostyla*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Česká republika, Írán, Německo, Slovensko

Podobá se *C. calycina*, ale malvice jsou široce vejčité až široce eliptické, tmavěčervené, velikosti 1 - 1,5cm, kalich má zpětně ohnuté kopinaté cípy a špičky jsou háčkovité. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *aceriformis* - Jeseníky, Chlum v Mor. krasu, Hodonín, Mikulov; bohatě větvený trnitý keř; výška 2 - 4m; palisty srpovité, dlouhé 0,6 - 1cm; listy tuhé, zelené, horní 3dílné nebo 3laločné, laloky protáhlé s výřezy do 1/2 pološířky čepele, zuby asymetrické, otupělé, báze klínovitá; plodem je červenočerná eliptická malvice velikosti 0,8 - 1,1cm obsahující 1 pecičku
- subsp. *carpatica* - Nízké Tatry, Kremnické vrchy; listy úzce podlouhlé až úzce kosočtvercovité, na bázi klínovité, celokrajné, v horní části 3laločné a 1 (i 2)x pilovité, mírně kožovité, spodní strana světlejší, v paždí žilek ochlupená, prostřední laloky je tupě 3laločný, ostatní jsou tupé nebo špičaté; malvice válcovitě eliptické, červené, velikosti 1 - 2cm, kališní cípy 3úhlé, úzce a dlouze špičaté, zpětně ohnuté
- subsp. *carstica* - Slovenský kras; listy široce obvejčité kosočtvercovité, hluboce 3 (i 5)x laločnaté, vrcholové laloky 2klané, asymetricky pilovité s ostrými zářezy do 1/2 pološířky čepele, dlouhé 2 - 3cm a široké 1,5 - 2cm, na jalových listech dlouhé i široké až 4cm; malvice kulovité, červené, kališní cípy velikosti 3mm, obsahují 1 pecičku
- subsp. *colorata* - Jánský vrch v Rychlebských horách; beztrnný keř; výška do 4m; listy sterilních větví kulovitě kosníkovité, peřenosečně 3 - 5dílné, hrubě pilovité, řídce i na okraji ochlupené, dlouhé 4,5 - 5cm, široké 4 - 6cm, na spodní strana v paždí žilek ochlupené, listy fertálních větví na bázi klínovité, mají 3 (i 5) 2klaných laloků s hlubokými hrubě zubatými zářezy, bělavě ochlupené; květenstvím je řídký chocholík, koruna je bílá, na okraji načervenalá, kališní cípy 3úhlé, zpětně ohnuté; malvice dlouze eliptické, červené, dlouhé 0,8 - 1,2cm
- subsp. *cremnicensis* - Kremnice; trnitý keř; výška 3 - 4m; větve stříbrošedé, trny hnědé, dlouhé 0,6 - 1,4cm; listy kožovité, mělce laločnaté, 2x pilovitě vroubkované, na sterilních větvích kosočtvercovité, 3laločné s vrcholovým lalokem 3klaným, dlouhé i široké 5cm, báze uťatá, listy na fertálních větvích vejčité až eliptické nebo kulovité, nedělené a na vrcholu mělce 3laločné
- subsp. *curvisepala* - listy všude pilovité, úzce laločnaté; malvice delší než široké
- subsp. *lindmanii*/C. *lindmanii*

<https://www.rostliny.net/>