

Kunzea ericoides

synonyma: *Baeckea phylicoides*, *Baeckea virgata* var. *polyandra*, *K. var. linearis*, *K. var. microflora*, *Kunzea glabriuscula*, *Kunzea leptospermoides*, *Kunzea peduncularis*, *Kunzea peduncularis* var. *brachyandra*, *Kunzea phylicoides*, *Leptospermum ericoides*, *Leptospermum ericoides* var. *lineare*, *Leptospermum ericoides* var. *microflorum*, *Leptospermum phylicoides*

čeleď: Myrtaceae

oblasti: Havajské ostrovy, J Austrálie, JV Austrálie, Nový Zéland, SV Austrálie, V Austrálie

Roste v Austrálii a na Novém Zélandě v podobě keře a stal se invazivním druhem na Havajských ostrovech. Dorůstá výšky 2 - 5 (i 10)m. Větve jsou slabé. Listy jsou střídavé, čárkovité až obkopynaté, bronzově zelené, mohou být mírně ochlupené, dlouhé 1,2 - 2,5cm a široké 2 - 5mm. Květenstvím je hrozen, vlastní květy jsou bílé, 5tičetné, na 3 - 6mm stopce a korunní lístky mají červenou bázi. Plody mají délku 2,5 - 3,5mm a průměr 3 - 4,5mm.

Vyhovují mu pobřežní duny a křoviny, ale i horské lesy. Dokáže růst i v blízkosti termálních pramenů.

<https://www.rostliny.net/>