

Chamaecytisus ratisbonensis (Čilimník řezenský)

synonyma: *Aulonix biflorus*, *Chamaecytisus biflorus*, *C. var. microphyllus*, *C. var. pirinicus*, *C. var. vandasii*, *Cytisus austriacus var. cinereus*, *Cytisus biflorus*, *Cytisus biflorus var. calabrus*, *Cytisus biflorus var. collinus*, *Cytisus biflorus var. longipedunculatis*, *Cytisus biflorus var. minor*, *Cytisus capitatus subsp. serotinus*, *Cytisus cinereus*, *Cytisus collinus*, *Cytisus communis*, *Cytisus falcatus*, *Cytisus hirsutus subsp. ratisbonensis*, *Cytisus hirsutus var. biflorus*, *Cytisus hirsutus var. serotinus*, *Cytisus hirsutus var. vulgaris*, *Cytisus horniflorus*, *Cytisus lithuanicus*, *Cytisus macrospermus*, *Cytisus pilosus*, *Cytisus pubescens*, *Cytisus ratisbonensis*, *Cytisus ratisbonensis f. biflorus*, *Cytisus ratisbonensis f. elatior*, *Cytisus ratisbonensis f. pedunculatus*, *Cytisus ratisbonensis subsp. biflorus*, *Cytisus ratisbonensis subsp. cinereus*, *Cytisus ratisbonensis subsp. horniflorus*, *Cytisus ratisbonensis var. biflorus*, *Cytisus ratisbonensis var. cinereus*, *Cytisus ratisbonensis var. microphyllus*, *Cytisus ratisbonensis var. minor*, *Cytisus ratisbonensis var. multiflorus*, *Cytisus ratisbonensis var. pirinicus*, *Cytisus ratisbonensis var. umbrosus*, *Cytisus ratisbonensis var. virgatus*, *Cytisus serotinus*, *Cytisus supinus*, *Cytisus supinus var. biflorus*, *Cytisus supinus var. microphyllus*, *Cytisus uralensis*, *Genista ratisbonensis*, *Tubocytisus biflorus*, *Tubocytisus elongatus*, *Viborgia hirsuta*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Česká republika, Kavkaz, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, S Asie, Slovensko, Ukrajina, Z Sibiř

Vyskytuje se v Evropě a na západní Sibiři. Roste v podobě beztrného keře. Dorůstá výšky 0,1 - 0,5 (i 1,5)m. Větve jsou poléhavé nebo vzpřímené až metlovité, v mládí přitiskle ochlupené. Listy jsou 3četné, řapíky jsou ochlupené a dlouhé 1cm. Vlastní lístky jsou pa obvejčité až kopinaté, dlouhé 0,7 - 2,5 (i 3,5)cm a široké 3 - 6 (i 9)mm. Kvete oboupohlavnými žlutými 2cm květy ve skupinách 1 - 3 (i 6)ks. Plodem je plochý podlouhlý hnědý přitiskle ochlupený lusk délky 2 - 3,5cm s mnoha hnědými lesklými semeny a délkou 2,5 - 3cm. Patří mezi vzácnější druhy C4. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *elongatus* - Křivoklátsko, Maďarsko; kališní listy horního pysku tupé
- subsp. *ratisbonensis* - jižní a východní Čechy, polabí; kališní listy horního pysku špičaté

Vyhovují mu travnaté nebo kamenité suché křovité stráně, louky, řídké okraje lesů, atp.

<https://www.rostliny.net/>