

Chamaecytisus ruthenicus

synonyma: Chamaecytisus caucasicus, Chamaecytisus czerniaeii, Chamaecytisus ratisbonensis subsp. ruthenicus, C. var. syreiszczikowii, Chamaecytisus ssyreiszczikovii, Cytisus biflorus, Cytisus caucasicus, Cytisus communis, Cytisus czerniaeii, Cytisus hirsutus, Cytisus pilosus, Cytisus ratisbonensis subsp. ruthenicus, Cytisus ruthenicus, Cytisus supinus, Cytisus syreiszczikowi, Cytisus syreiszczikowii

čeleď: Fabaceae

oblasti: Kavkaz, Polsko, V Evropa, Z Rusko, Z Sibiř

Roste ve východním Polsku, Kavkaze, západním Rusku a západní Sibiři. Dorůstá výšky 0,25 - 1,5 (i 2)m. Větve jsou vzpřímené nebo prutovité, na konci přitiskle ochlupené. Listy mají chlupaté 1 - 2cm řapíky, jsou 3četné, vlastní lístky eliptické nebo kopinaté se zaobleným a hrotitým koncem, přitiskle ochlupené, dlouhé 1 - 1,7cm a široké 4 - 8mm. Kvete po 2 - 5ks v paždí listů na 3 - 5mm stopce bílými nebo nažloutlými květy. Pavéza může být tečkovaná. Plodem je přitiskle ochlupený lusk délky 3 - 3,5cm a šířky 6 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>