

Crassula schimperi

synonyma: *Combesia lanceolata* subsp. *transvaalensis*, *Combesia schimperi*, *Crassula lanceolata* subsp. *transvaalensis*, *Crassula pentandra*, *C. f. abbreviata*, *C. subsp. schimperi*, *C. subsp. transvaalensis*, *C. var. schimperi*, *Crassula selago*, *Crassula subulata*, *Crassula tibestica*, *Crassula transvaalensis*, *Disporocarpa pentandra*, *Sedum transvaalense*, *Sedum transvaalensis*, *Sedum transvalense*, *Thisantha subulata*, *Tillaea pentandra*, *Tillaea schimperi*, *Tillaea schimperi* subsp. *transvalensis*, *Tillaea subulata*

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Angola, Čad, Demokratická Republika Kongo (Zair), Eritrea, Etiopie, Free State, Indie, Jemen, Kamerun, Kapsko, Keňa, KwaZulu-Natal, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Nepál, Pákistán, Rwanda, Saudská Arábie, Sokotra, Somálsko, Súdán, Svazijsko, Tanzánie, Transvaal, Uganda, V Himálaj, Xizang (Tibet), Z Himálaj, Zambie, Zimbabwe

Roste od Súdánu po JAR a na východ po Tibet jako vzpřímená trvalka. Stonek má průměr až 5mm. Borka je tmavě hnědá až červeně hnědá. Listy jsou přisedlé, kopinaté až vejčité, čárkovité nebo 3úhlé, špičaté nebo zašpičatělé, dlouhé do 1,2cm a široké do 3mm. Květenstvím je (1 -) 3 - 12tikvětý vrcholík, vlastní květy jsou (4 -) 5tičetné, mají kališní laloky úzce 3úhlé až kopinaté, dlouhé 0,7 - 1,8mm, široké 0,2 - 0,3mm, korunní lístky úzce vejčité nebo kopinaté, špičaté, bělavé, nažloutlé nebo růžové,

<https://www.rostliny.net/>