

Cortaderia (Kortaderie)

čeleď: Poaceae

Roste v Jižní Americe, Novém Zélandu a Papui-Nové Guineji v trsech. Stonky jsou vysoké. Listy jsou dlouhé, zašpičatělé, zpravidla drsné s ostrými okraji. Květenstvím je lata složená z bílých až stříbřitých klásků.

Vyhovuje ji propustná půda bohatá na živiny, teplo, plné slunce a chráněné místo. Na zimu se stébla svážou. Místo je na toto období dobré také opatřit nějakou ochranou proti vlhku. Na jaře rostlinu seřízněte nízko nad zemí. Důležité je, aby k sestřihu došlo až po zimě, jinak je vysoká pravděpodobnost, že rostlina bud' shnije nebo ji vnitřně díky otvorům ve stéblech roztrhá mráz.

Množí se semeny nebo dělením.

Cortaderia araucana

synonyma: *C. araucana* var. *fuenzalidae*, *C. araucana* var. *skottsbergii*, *C. longicauda*, *C. quila* var. *patagonica*, *Moorea araucana*

oblasti: Čile

Roste v Čile.

Cortaderia archboldii

synonyma: *Chionochloa archboldii*, *Danthonia archboldii*, *Danthonia macgregorii*

Cortaderia atacamensis

synonyma: *Gynerium atacamense*

oblasti: Atacama, Čile

Cortaderia bifida

synonyma: *C. aristata*, *C. trianae*

Cortaderia boliviensis

synonyma: *C. bifida* var. *grandiflora*

Cortaderia columbiana

synonyma: *C. parviflora*, *Gynerium columbianum*

Cortaderia fulvida

synonyma: *Arundo conspicua* var. *fulvida*, *Arundo fulvida*

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu.

Cortaderia hapalotricha

synonyma: *C. scabriflora*, *Danthonia hapalotricha*

Cortaderia jubata

synonyma: *Gynerium jubatum*, *Gynerium pygmaeum*, *Gynerium quila* var. *pygmaeum*

oblasti: Havajské ostrovy, Kalifornie, Oregon, Washington

Pochází ze severozápadu Jižní Ameriky.

Cortaderia modesta

synonyma: *C. modesta* f. *ramosa*, *Gynerium modestum*, *Gynerium ramosum*

oblasti: JV Brazílie

Roste v Brazílii v trsech. Dorůstá výšky 1m. Většina listů na rostlině je odumřelá.

Cortaderia nitida

synonyma: *Arundo calycina*, *Arundo nitida*, *C. sodiroana*, *Gynerium nitidum*

Cortaderia pilosa

synonyma: *Ampelodesmos australis*, *Arundo pilosa*, *Calamagrostis patula*, *Calamagrostis scirpiformis*, *C. minima*, *C. pilosa* var. *minima*, *Cynodon pilosissimus*, *Gynerium nanum*, *Gynerium pilosum*, *Phragmites pilosus*, *Poa phragmites*

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu v podobě poléhavého keře. Dorůstá výšky 50cm. Kmínky jsou 4hranné. Větve jsou štíhlé. Listy jsou prakticky vstřícné, kopinaté, špičaté, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 1,5 - 3mm a řapíky jsou dlouhé 1mm. Květenstvím je 3 - 6cm dlouhý hrozen objevující se po 1 - 3ks, vlastní květy mají až 3mm stopky, kališní lístky vejčité, dlouhé 1,5mm a korunní lístky jsou podobné.

Cortaderia planifolia

Cortaderia pungens

synonyma: *Danthonia confusa*

Cortaderia richardii

synonyma: *Arundo australis*, *Arundo kakao*, *Arundo richardii*, *Gynerium zeelandicum*

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu.

Cortaderia roraimensis

synonyma: *Arundo roraimensis*

Cortaderia rudiuscula

synonyma: *Gynerium argenteum* var. *parviflorum*, *Gynerium rudiusculum*, *Moorea rudiuscula*

oblasti: Jižní Amerika

Pochází z Jižní Ameriky.

Cortaderia selloana (Kortaderie dvoudomá)

synonyma: *Arundo dioeca*, *Arundo kila*, *Arundo selloana*, *C. argentea*, *C. dioica*, *Gynerium argenteum*, *Gynerium dioicum*, *Gynerium purpureum*, *Moorea argentea*

oblasti: Alabama, Argentina, Francie, Georgia, J Brazílie, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Makaronésie, New Jersey, Oregon, Střední Čile, Střední středozemí, Tennessee, Texas, Uruguay, Utah, Velká Británie, Virginie, Washington

Roste na jihu Jižní Ameriky jako dvoudomá trvalka v trsech. Stébla jsou tuhá a dlouhá do 1,2 (i 3)m. Převislé šedě zelené ploché listy jsou čárkovité, tuhé a na okraji drobně ostře pilovité, sivě zelené, dlouhé 1 - 2 (i 3)m a široké 1cm. Květenstvím je lata délky (0,3 -) 0,5 - 1m, může být mírně převislá, postranní větve samčího květenství směřují vzhůru, samičí jsou vodorovně rozkladité, klásky jsou 2 - 7mikvěté, osinaté, dlouhé 1,5cm, zploštělé, stříbřitě lesklé, někdy načervenalé. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aureolineata' - listy zelené se žlutým okrajem
- 'Gold Band' - výška 1 (i 1,75)m, bílé květy
- 'Pumila' - výška 0,8 (i 1,2)m, otuzilejší, vzdušnější, bílé květy
- 'Rendatleri' - květy růžové
- 'Roi des Roses' - výška 1 (i 2)m
- 'Rosea' - výška 1 (i 1,75)m, růžové květy
- 'White Plume' - výška 1,5m; stříbřitě bílé zpeřené laty

Potřebuje slunné místo s hlubokou, vlhkou, výživnou a propustnou půdou na chráněném stanovišti s plným sluncem. Nemá ráda přemokření. Během vegetace pravidelně zalévejte a přihnojujte. Potřebuje ochranu v době zimního období s ohledem na omezení přístupu vody.

Množí se dělením trsů.

Cortaderia sericantha

synonyma: *Danthonia jubata*, *Danthonia sericantha*

Cortaderia speciosa

synonyma: *Gynerium argenteum* var. *strictum*, *Gynerium speciosum*, *Moorea speciosa*

Cortaderia splendens

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu.

Cortaderia toetoe

oblasti: Nový Zéland

Pochází z Nového Zélandu.

Cortaderia turbaria

Cortaderia vaginata

Další informace:

<http://bambusy-travy.atlasrostlin.cz/kortaderie>

<http://botany.cz/cs/cortaderia-selloana/>

<http://www.profizahrada.cz/a/cz/2702-cortaderia-selloana-pampova-trava-kortaderie/>

<https://www.rostliny.net/>